

Instrukcja pobrania materiału do badania parazytologicznego kału oraz wymazu w kierunku jaj owsika.

Badanie parazytologiczne kału

Rekomenduje się 3-krotne wykonanie badania w kierunku pasożytów i jaj pasożytów z 3 różnych pobrań kału, co znacznie zwiększa skuteczność diagnostyki parazytologicznej. Zaleca się by próbki kału pobierać co 2-4 dni.

Przygotowanie do badania

- Jeśli lekarz nie zalecił inaczej, nie wykonuj badania w trakcie leczenia lekami przeciwpasożytniczymi, preparatami zawierającymi związki baru, bizmutu i magnezu, lekami przeciwgorączkowymi i antybiotykami oraz przez około 2 tygodnie po zakończeniu terapii.
- W aptece lub punkcie pobrań zaopatr się w jednorazowy pojemnik na kał z łopatką.

Pobranie kału

- Jednorazowy pojemnik na kał podpisz imieniem i nazwiskiem, datą urodzenia oraz datą i godziną pobrania.
- Kał oddaj do czystego naczynia lub ewentualnie na czysty papier, nigdy do muszli klozetowej, gdyż mogłoby to spowodować zniszczenie niektórych form pasożytów.
- Łopatką, umieszczoną na zatyczce pojemnika na kał, pobierz z kilku miejsc próbki stolca, tak by swobodnie zmieściły się w pojemniku.
- Zamknij szczelnie pojemnik i umieść go w foliowym worku

Transport

- Próbkę kału dostarcz niezwłocznie do punktu pobrań.
- Jeśli jest to niemożliwe przechowuj mocz do czasu transportu w temperaturze lodówki.

Badanie nie wymaga szczególnego przygotowania się do pobrania próbki kału.

Próbkę kału pobierz za pomocą łopatki

Badanie w kierunku jaj owsików

Zaleca się wykonanie do 3 oznaczeń w odstępach 3-5 dni, jeżeli otrzymano negatywny wynik 1 i 2 badania.

Przygotowanie do badania

- W aptece zaopatr się w zestaw do wykonania wymazu okołodbytniczego (przyłepiec + szkiełko)

Pobranie wymazu

- Wymaz wykonaj rano zaraz po przebudzeniu przed oddaniem moczu, bądź stolca oraz przed wykonaniem czynności higienicznych.
- Przyłepiec odklej od szkiełka. Jedną ręką rozchyl pośladki, a drugą dokładnie przyklej przyłepiec w okolicy odbytu kilkakrotnie dociskając go palcem.

- Po około 5 sekundach odklej przylepiec od skóry i przyklej go do szkiełka, uważając by nie powstały pęcherzyki powietrza.

Transport

- Wymaz dostarcz tego samego dnia do punktu pobrań.